

総合外科_レジメン 2024.5 更新

・胃がん

レジメン名称	抗がん薬	用量	単位	投与日	1クール	備考
DCS	ドセタキセル点滴静注	40	mg/m ²	Day8	28	* 腎障害時は60mg/m ²
	シスプラチン注	70*	mg/m ²	Day8		
	TS1	80~120	mg	Day1-14		
ドセタキセル	ドセタキセル点滴静注	60	mg/m ²	Day1	21	
S1+ドセタキセル療法 (S1:2投1休)	ドセタキセル点滴静注	40	mg/m ²	Day1	21	
	TS1	80~120	mg	Day1-14		
CDDP+S1 3week	シスプラチン注	60	mg/m ²	Day1	35	
	TS1	80~120	mg	Day1-21		
CDDP+S1 2week	シスプラチン注	60	mg/m ²	Day1	21	
	TS1	80~120	mg	Day1-14		
ハーセプチン (1投与2休)	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1	21	* 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg
ハーセプチン+XP	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1	21	* 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg
	シスプラチン注	80	mg/m ²	Day1		
	ゼローダ錠	2000	mg/m ²	Day1-14		
サイラムザ+パクリタキセル	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	Day1,15	28	
	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day1,8,15		
アブラキサン (胃がん)	アブラキサン点滴静注用	260	mg/m ²	Day1	21	
イリノテカン単独	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1	14	
イリノテカン+シスプラチン	イリノテカン注	60	mg/m ²	Day1	14	
	シスプラチン注	30	mg/m ²	Day1		
SOX療法	エルブラット点滴静注液	100	mg/m ²	Day1	21	
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
XELOX (胃癌)	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1	21	
	ゼローダ錠	C法	mg/m ²	Day1-14		
XP	シスプラチン注	80	mg/m ²	Day1	21	
	ゼローダ錠	2000	mg/m ²	Day1-14		
オブジーボ+SOX療法	オブジーボ点滴静注	360	mg/Body	Day1	21	
	エルブラット点滴静注液	100	mg/m ²	Day1		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
サイラムザ単独	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	Day1	14	
ハーセプチン+S-1 (80mg/m ²)	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1	21	* 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
ハーセプチン+SOX療法	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1	21	* 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg
	エルブラット点滴静注液	100	mg/m ²	Day1		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
ハーセプチン+XELOX	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1	21	* 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg
	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1		
	ゼローダ錠	C法	mg/m ²	Day1-14		
パクリタキセル (胃がん・1投1休)	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day1	14	
パクリタキセル (胃がん・3投1休)	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day1,8,15	28	

・胆道がん、膵臓がん

レジメン名称	抗がん薬	用量	単位	投与日	1クール	備考
胆道がんGC	シスプラチン注	25	mg/m ²	Day 1,8	21	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day 1,8		
ゲムシタピン (1投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day1	14	
ゲムシタピン (3投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day 1,8,15	28	
FOLFIRINOX	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1	14	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	180	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
アブラキサン+ゲムシタピン (3投)	アブラキサン点滴静注用	125	mg/m ²	Day 1,8,15	28	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day 1,8,15		
ゲムシタピン+TS1 (2投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day 1,8	21	
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		

・大腸がん

レジメン名称	抗がん薬	用量	単位	投与日	1クール	備考
XELOX	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1	21	
	ゼローダ錠	C法		Day1-14		
アバスチン+XELOX	アバスチン点滴静注用	7.5	mg/kg	Day1	21	
	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1		
	ゼローダ錠	C法		Day1-14		
ゼローダ+アバスチン	アバスチン点滴静注用	7.5	mg/kg	Day1	21	
	ゼローダ錠	C法		Day1-14		
IRIS	イリノテカン注	125	mg/m ²	Day1,15	28	
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
アバスチン+IRIS	アバスチン点滴静注用	5~10	mg/kg	Day1,15	28	
	イリノテカン注	125	mg/m ²	Day1,15		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
SOX療法	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1	21	
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
アバスチン+SOX療法	アバスチン点滴静注用	7.5	mg/kg	Day1	21	
	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
mFOLFOX6	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1	14	
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
アバスチン+mFOLFOX6	アバスチン点滴静注用	5~10	mg/kg	Day1	14	
	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
外来FOLFIRI	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1	14	
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
アバスチン+外来FOLFIRI	アバスチン点滴静注用	5~10	mg/kg	Day1	14	
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
アバスチン+FOLFOXIRI	アバスチン点滴静注用	5	mg/kg	Day1	14	
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1		
	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	3200	mg/m ²	Day1-2		
アバスチン/5FU/ I-LV	アバスチン点滴静注用	5	mg/kg	Day1,15,29,43	56	
	レボホリナート点滴静注用	250	mg/m ²	Day1,8,15,22,29		
	5-FU	600	mg/m ²	Day1,8,15,22,29		
アービタックス+イリノテカン	アービタックス注射液	*	mg/m ²	Day1,8,15,22	28	*初回クールDay1のみ400mg/m ² 、以降は250mg/m ²
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1,15		
アービタックス単独	アービタックス注射液	*	mg/m ²	Day1,8,15,22	28	*初回クールDay1のみ400mg/m ² 、以降は250mg/m ²
アービタックス+mFOLFOX6	アービタックス注射液	*	mg/m ²	Day1	14	*初回クールDay1のみ400mg/m ² 、以降は250mg/m ²
	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
アービタックス+外来FOLFIRI	アービタックス注射液	*	mg/m ²	Day1	14	*初回クールDay1のみ400mg/m ² 、以降は250mg/m ²
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
ザルトラップ+外来FOLFIRI	ザルトラップ点滴静注	4	mg/kg	Day1	14	
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
ベクティビックス+IRIS	ベクティビックス点滴静注	6	mg/kg	Day1,15	28	
	イリノテカン注	125	mg/m ²	Day1,15		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
ベクティビックス+mFOLFOX6	ベクティビックス点滴静注	6	mg/kg	Day1	14	
	エルブラット点滴静注液	85	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
ベクティビックス+外来FOLFIRI	ベクティビックス点滴静注	6	mg/kg	Day1	14	
	イリノテカン注	150	mg/m ²	Day1		
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²	Day1		
	5-FU	400	mg/m ²	Day1		
	5-FU	2400	mg/m ²	Day1-2		
ベクティビックス+SOX療法	ベクティビックス点滴静注	7.5	mg/kg	Day1	21	
	エルブラット点滴静注液	130	mg/m ²	Day1		
	TS1	80~120	mg	Day 1-14		
ベクティビックス単独	ベクティビックス点滴静注	6	mg/kg	Day1	14	
TAS102+Bmab	アバスチン点滴静注用	5	mg/kg	Day1,15	28	
	ロンサーフ配合錠	70	mg/m ²	Day1-5,Day8-		

・乳がん

レジメン名称	抗がん薬	用量	単位	投与日	1クール	備考
ゲムシタピン	ゲムシタピン点滴静注用	1250	mg/m ²	Day1,8	21	
ゲムシタピン (1投1休)	ゲムシタピン点滴静注用	1250	mg/m ²	Day1	14	
AC	ドキシロピシン塩酸塩注射用	60	mg/m ²	Day1	21	
	注射用エンドキサン	600	mg/m ²	Day1		
EC	エビルピシン塩酸塩	90	mg/m ²	Day1	21	
	注射用エンドキサン	600	mg/m ²	Day1		
ドセタキセル	ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	Day1	21	
パクリタキセル (乳がん補助療法)	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day1	14	
パクリタキセル (乳がん補助療法)	パクリタキセル注	80	mg/m ²	Day1,8,15	28	
CEF	エビルピシン塩酸塩	45	mg/m ²	Day1,8	28	
	5-FU注	500	mg/m ²	Day1,8		
	エンドキサン錠	1回50mg 1日2回		Day1-14		
CMF	注射用メソトレキセート	40	mg/m ²	Day1,8	28	
	5-FU注	500	mg/m ²	Day1,8		
	エンドキサン錠	1回50mg 1日2回		Day1-14		
ddEC (アロカリス)	エビルピシン塩酸塩	90	mg/m ²	Day1	14	
ddEC (アロカリス)	注射用エンドキサン	600	mg/m ²	Day1	14	
ddパクリタキセル療法	パクリタキセル注	175	mg/m ²	Day1	14	
TC	ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	Day1	21	
	注射用エンドキサン	600	mg/m ²	Day1		
FEC100	エビルピシン塩酸塩	100	mg/m ²	Day1	21	
	注射用エンドキサン	500	mg/m ²	Day1		
	5-FU注	500	mg/m ²	Day1		
ハーセプチン初回 (3週に1回)	トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	Day1	21	
ハーセプチン2回目以降 (3週に1回)	トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg	Day1	21	
ゾラデックス 10.8m g	ゾラデックスLA デポ	10.8	mg/Body	Day1	84	
ゾラデックス 3.6m g	ゾラデックス デポ	3.6	mg/Body	Day1	28	
リュープリン療法 (11.25m g)	リュープリン注射用キット	11.25	mg/Body	Day1	84	
リュープリン療法 (22.5mg)	リュープリン注射用キット	22.5	mg/Body	Day1	168	
リュープリン療法 (3.75m g)	リュープリン注射用キット	3.75	mg/Body	Day1	28	
アバスチン+パクリタキセル	アバスチン点滴静注用	10	mg/kg	Day1,15	21	
	パクリタキセル注	90	mg/m ²	Day1,8,15		
アブラキサン療法	アブラキサン点滴静注用	260	mg/m ²	Day1	21	
イリノテカン単独 1投0休 (レジメン)	イリノテカン注	100	mg/m ²	Day1,8,15	35	
カドサイラ	カドサイラ点滴静注用	3.6	mg/kg	Day1	21	
キイトルーダ (200mg) +ゲムシタピン	キイトルーダ点滴静注	200	mg/Body	Day1	21	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day1,8		
	バラブラチン注	AUC2		Day1,8		
キイトルーダ (400mg) +ゲムシタピン	キイトルーダ点滴静注	400	mg/Body	Day1	42	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	Day1,8,22,29		
	バラブラチン注	AUC2		Day1,8,22,29		
キイトルーダ (3週間毎)	キイトルーダ点滴静注	200	mg/Body	Day1	21	パクリタキセルと併用
キイトルーダ (6週間毎)	キイトルーダ点滴静注	400	mg/Body	Day1	42	パクリタキセルと併用
ナベルピン	ナベルピン注	25	mg/m ²	Day1,8	21	
バージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル 初回	バージェタ点滴静注	840	mg/Body	Day1	21	
	トラスツズマブ注	8	mg/kg	Day1		
	ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	Day1		
	デカドロン錠	1回4mg 1日2回		Day1,2		
バージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル 2回目以降	バージェタ点滴静注	420	mg/Body	Day1	21	
	トラスツズマブ注	6	mg/kg	Day1		
	ドセタキセル点滴静注	75	mg/m ²	Day1		
	デカドロン錠	1回4mg 1日2回		Day1,2		
ハーセプチン+ナベルピン	ナベルピン注	25	mg/m ²	Day1,8	21	
	トラスツズマブ注	*	mg/kg	Day1,8,15		* 初回 Day1のみ4mg/kg、以降2mg/kg
ハラヴェン	ハラヴェン静注	1.4	mg/m ²	Day1,8	21	
フェノロデックス	フェノロデックス筋注	500	mg/Body	Day1,15,29*	* 4回目以降は4週毎	250mgずつ2回投与